


HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Advantage 40 4 kg alatti macskáknak A.U. V.

Advantage 80 4 kg feletti macskáknak A.U. V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Advantage	40	80	
Hatóanyag : Imidacloprid*	40,0	80,0	mg/pipetta
Antioxidáns Butilhidroxi-toluén (Ph Eur)	0,4	0,8	mg/pipetta
Vivőanyag	ad 0,4	0,8	ml

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft. (1123, Budapest, Alkotás u. 50)

A gyártási tétel felszabadításért felelős gyártó: KVP, Pharma- und Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Németország)

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Macska

5. JAVALLATOK

Macskák bolháságának megelőzésére és kezelésére, ezáltal a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) megelőzésre, illetve a gyógykezelés részeként.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Macska testtömege	Termék	Pipetták száma	mg / ttkg
4 kg alatt	Advantage 40	1 x 0,4 ml	min.10 mg
4 -8 kg	Advantage 80	1 x 0,8 ml	max.20 mg
8 kg feletti testtömeg esetén az Advantage 80 4 kg feletti macskáknak készítmény 8 pipettáját (0.8 ml) kell használni.			

Csak ép bőrfelületre juttassuk a készítményt. Ne engedjük, hogy a frissen kezelt állatok egymást nyalogassák.

7. ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD

Rácsepegtetés (spot on)

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Vegyen ki egy pipettát a csomagból. Tartsa a pipettát álló helyzetben, kupakkal felfelé, és csavarva húzza le a biztonsági kupakot. A kupakot fordítsa meg, nyomja rá a pipetta végére, és csavarva húzza le.



Húzza szét a szőrt a macska tarkótájéján. Érintse a pipetta hegyét az állat bőréhez, és többször erőteljesen nyomja össze a pipettát, amíg a teljes tartalma a bőrre kerül.



A termék keserű ízű. Esetenként előfordulhat nyáladás, ha a macska a kezelés után azonnal nyalogatja a kezelés helyét. Ez nem mérgezési tünet, és kezelés nélkül néhány percen belül megszűnik. A tarkótájéjra juttatva az állatnak minimális esélye van a készítmény lenyalására.

Kerüljük a szernek az állat szemébe jutását. A macskán élősködő bolhák 1 napon belül elpusztulnak. Egy kezelés kb 4 hétig véd a bolhafertőzés ellen. Mivel a macska környezetében élő fejlődési alakok állandó veszélyt jelentenek az állatra, az optimális megelőzés és gyógykezelés érdekében a kezelést havonta meg kell ismételni. Megázás a szer hatékonyságát nem befolyásolja. Csak ép bőrfelületre juttassuk a készítményt. Ne engedjük, hogy a frissen kezelt állatok egymást nyalogassák.

9. ELLENJAVALLATOK

Advantage 80: 4 testtömeg kg-nál kisebb vagy 8 hetesnél fiatalabb macskán alkalmazása ellenjavallt.

Advantage 40: 8 hetesnél fiatalabb macskán alkalmazása ellenjavallt

Patkányon és nyúlön imidaclopridai végzett vizsgálatokban nem találtak elsődleges embrió-toxikus, teratogenitásra és reprodukciós toxicitása utaló hatást. Vemhes és kölykeit szoptató szukákkal végzett vizsgálatok korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az eredmények azt támasztják alá, hogy nem kell nemkívánatos hatásra számítani ezeken az állatokon.

10. MELLÉKHATÁSOK

A termék keserű ízű. Esetenként előfordulhat nyáladás, ha a macska a kezelés után azonnal nyalogatja a kezelés helyét. Ez nem mérgezési tünet, és kezelés nélkül néhány percen belül megszűnik. Ha egyéb nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmiszertermelő állat a készítménnyel nem kezelhető.

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15°C - 25°C között, száraz helyen tárolandó.

Lejárató idő 4 év

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.



13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Legyengült, idős, vemhes vagy szoptató állat kezelése esetén, ha az állat egyéb gyógykezelésben részesül, a kezelés előtt az állatorvossal konzultálni kell. Ha a szer figyelmen kívül hagyásával az állat vagy ember szájába kerül, mozgászavart, remegést, görcsöket okozhat. Aktív szén adásával a mérgezés tünetei enyhíthetők, melyeket tünetileg kell kezelni. Specifikus antidótum nem ismeretes.

Csak külsőleg alkalmazható! A készítmény oldószere egyes anyagokon, pl. műanyag, bőrön, kárpiton stb. foltot hagyhat. A lejárati időn túl nem alkalmazható. Élelmiszertermelő állatok a szerrel nem kezelhetők. Takarmánytól, élelmiszerektől elkülönítetten kell tárolni.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók

A készítmény ajánlott adagjának kétszeresét alkalmazva a következő általános gyakorlatban használt állatorvosi termékekkel kompatibilis volt: fention, lufenuron, milbemycin, febantel, pyrantel, praziquantel. A készítmény kompatibilitását sok, gyakorlati körülmények között rutinszerűen alkalmazott kezeléssel (vakcinázást is beleértve) bizonyították.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidótumok) (ha szükséges)

Nyolc héten keresztül, heti egy alkalommal, a terápiás dózis 5-szörösével kezelve nemkívánatos hatás nem volt megfigyelhető. A véletlenszerű szájon át való felvétel utáni mérgezés valószínűtlen. Mérgezés esetén állatorvosi felügyelet mellett tüneti kezelést kell alkalmazni. Specifikus antidótum nem ismert, de aktív szén adása jótékony hatású lehet.

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvrendszabályok.

Nagyon ritka esetben, mint helyileg alkalmazandó szernek a használata után előfordulhatnak egyedi bőrtünetek (pl.: allergia, bőrirritáció). Meg kell akadályozni, hogy a készítmény szembe, szájba kerüljön. Ha véletlenül a készítmény a szembe kerül, bő vízzel ki kell öblíteni. Ha a bőr vagy szem érzékenysége huzamosabb ideig fennáll, vagy a készítményt véletlenül lenyelték, orvoshoz kell fordulni és a készítmény használati utasítását bemutatni. Ismerten érzékeny bőrű emberek a termékekre különösen érzékenyek lehetnek.

14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006. március 20.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

16.1. Rendelhetőség

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

16.2. Forgalmazhatóság

Szabadon forgalmazható.

16.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

- 2 pipetta buboréksomagolásban, papírdobozban
- 3 pipetta buboréksomagolásban, papírdobozban
- 4 pipetta buboréksomagolásban, papírdobozban
- 6 pipetta buboréksomagolásban, papírdobozban

16.4. Törzskönyvi szám

753/1997 FVM

