

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**
Bayvarol csík A.U.V.
 2. **HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**
1 csík tartalmaz :
Flumetrin 3,6 mg
 3. **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL**
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft. (1123, Budapest, Alkotás u. 50.)
A gyártási tétel felszabadításáért felelős gyártó: KVP, Pharma- und Veterinär-Produkte GmbH. (Kiel, Németország)
 4. **CÉLÁLLAT FAJOK**
Mézelő méh.
 5. **JAVALLAT(OK)**
Mézelő méhek *Varroa jacobsoni* okozta fertőzésének diagnosztizálására és gyógykezelésére.
 6. **ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**
A készítmény egyszeri adagja: 14,4 mg flumetrin / kaptár, amely a készítményből 4 csíknak felel meg.
 7. **ADAGOLÁS - ÉS ALKALMAZÁSMÓD**
Méhkaptárban alkalmazás.
Jól fejlett, egészséges családok esetében 4 csíkot kell alkalmazni. Gyenge családok, fiatal és mesterséges rajok, amelyek a lépek kevesebb, mint felét népesítik be, fél adaggal, azaz 2 csíkkal kezelhetők.
A hordás alatt, ill. pergetés előtt nem alkalmazható. Az alumínium tasakot közvetlenül használat előtt kell felbontani.
Diagnózis
A csíkok behelyezése előtt a kaptár aljára helyezzünk el egy fehér lapot. A csíkokat legalább 24 órán át hagyjuk a kaptárban, majd ezután ellenőrizzük a lapon, hogy található-e rajta *Varroa* atka.
Gyógykezelés
A kezelés legalább 15 napig és legfeljebb 6 hétig tarthat.
 8. **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**
A Bayvarol csíkokat a fészek központi részében, a léputcákban szükséges elhelyezni úgy, hogy a méhek mindkét felületén közlekedhessenek. Ehhez a csík felső részén található vállakat a megjelölt helyen, azonos irányba kell hajlítani, és a keret felső lécére akasztva lógatni a léputcákba (1. ábra). A kaptár méretétől függően – 2 csík az alsó részénél összekapcsolható (2. ábra).
-
9. **ELLENJAVALLATOK**
Más varroa ellenes szerrel egy időben nem használható.
Nosema ellenes szerrel egy időben nem használható.
 10. **MELLÉKHATÁSOK**
Nem ismeretesek.
 11. **ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: méz: 0 nap
 12. **KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
25 °C alatt tárolandó. Száraz helyen, fénytől védve tartandó.
 13. **KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK**
A készítmény használata alatt enni, inni, dohányozni tilos.
A csíkok kézbevétele után, étkezés előtt és munka után mosson kezet. Ha a készítmény bőrre vagy szembe kerül, alapos vizes öblítés szükséges.
 14. **A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK.**
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladékanyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.



15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2005. augusztus 24.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához.

16.1. Rendelhetőség

Vény nélkül. Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

16.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.3. Kiszerezési egységek

5, egyenként 4 db-es/ot tartalmazó alumínium tasak, papírdobozban.

16.4. Törzskönyvi szám

430/1991 FVM

