

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Perizin oldat A.U.V

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 ml oldat tartalmaz:

kumafosz

32 mg

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungaria Kft. (1123 Budapest Alkotás u. 50.)

Gyártó: KVP, Pharma- und Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Németország)

4. CÉLÁLLAT FAJ

Mézelő méh

5. JAVALLAT(OK)

Mézelő méh *Varroa jacobsoni* okozta fertőzésének diagnosztizálására és kezelésére.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A Perizin kizárólag a használatra kész munkaemulzió elkészítése után alkalmazható. Jól fejlett, egészséges méhcsaládok esetében kezelésként 50 ml/család munkaemulzió alkalmazandó. Gyenge családok esetében, amikor a méhek csak a lépek felét népesítik be, fél adaggal (25 ml/család) kezeljük. Mesterséges, illetve fiatal rajokat 10-25 ml Perizinnel ajánlatos kezelni.

Diagnózis: A varroózis kimutatására egyszeri kezelés elegendő.

Terápia: A varroózis felszámolása céljából 7 napos időközzel kétszer kell kezelni.

7. ADAGOLÁS - ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)

Méhkaptárban alkalmazás.

A Perizin kizárólag a használatra kész munkaemulzió elkészítése után alkalmazható!

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A kezelést célszerű a Perizin készlettel elvégezni.



A munkaemulziót úgy állítjuk elő, hogy a szükséges mennyiségű Perizint a készlethez tartozó műanyag flakonba öntjük és vízzel elegyítjük (1/b kép)

10 ml Perizint (egy üveg tartalmát) 500 ml-re hígítjuk fel, vagyis 1 ml-ből 50 ml munkaemulzió készítenéd (1/a kép).

Ezt követően a Perizin készlet adagoló részét, a toldalékcsovet és a hegyet összeállítjuk (2. kép), majd szorosan a műanyag flakonra csavarjuk (3.kép).

Végül a munkaemulziót jól összerázzuk. Egy család kezeléséhez elegendő munkaemulziót (lásd adagolás) a flakon megnyomásával az adagolóba juttatjuk (4. kép) és egyenletesen a léputcák mentén a méhekre csepegtetjük (5. kép).

A kezelést a hordási időn kívül, illetve tavasszal, legkésőbb 6 héttel a hordási időszak megkezdése előtt kell elvégezni, a kezelendő méhcsaládoknak megközelítően fiasítás mentesnek kell lenniük.



A munkaemulziót tárolni nem szabad, kezelés előtt mindig frissen kell elkészíteni!

A kezelés időtartama:

Diagnózis: A varroózis kimutatására egyszeri kezelés elegendő. A kezelés előtt helyezzünk egy fehér lapot a kaptár aljára. Egy nappal később ellenőrizzük a lapon, hogy található-e rajta elpusztult varroa atka.

Terápia: A varroózis felszámolása céljából 7 napos időközzel kétszer kell kezelni.

Az egy méhészethez tartozó összes családot egyidejűleg kell kezelni.

A fedett fiasítás meglétekor abban az atkák túlélnek, így ebben az időszakban kétszeri kezelés nem elegendő. A kezeléskor a munkaemulzió hőmérséklete ne legyen 25C-nál alacsonyabb. Minden elfoglalt léputcát kezelni kell.

9. ELLENJAVALLATOK

Mézhordás előtt és alatt használni tilos. A kezelést 6 héttel a mézhordás előtt be kell fejezni. 5°C alatti hőmérsékleten ne kezeljük a méheket.

10. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretesek.

11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Méz: 42 nap.

Amennyiben a Perizin alkalmazás és a hordás megkezdése előtt 42 napnál rövidebb idő telt el, úgy az ezt követő időben nyert mézet sem emberi fogyasztásra, sem a méhek táplálására használni nem szabad! A kezelt méhcsaládoktól származó viasz emberi fogyasztásra, továbbá élelmiszeripari, kozmetikai és gyógyszeripari felhasználásra nem kerülhet.

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

30°C alatt tárolandó. Élelmiszerektől elzárva tartandó.

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Az ajánlott dózist meghaladva az elhullás növekedhet.

Ne alkalmazzuk egyidejűleg egyéb kolinerg hatású szerekkel (imidazotiazolok, tetrahidropirimidinek)

A készítmény alkalmazása közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Vigyázzunk, hogy a készítmény ne kerüljön a bőrre.

Alkalmazás után mossunk kezet.

A Perizin az szervesfoszforsav-származékok közé tartozik. Előírás szerint használva nem mérgező. Véletlen mérgezés esetén forduljon orvoshoz, és mutassa meg neki a készítmény használati utasítását

Antidotum mérgezés esetén: 1% Atropin-szulfát injekció izomba.

Adagolás (ember): 0.2 - 0.5 ml.

Az atropin injekció megismételhető, ha az atropin hatása megszűnt és a mérgezési tünetek (pupilla tágulat, izomremegés, hányás, hasmenés) rosszabbodnak.

14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006. március 6.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**16.1. RENDELHETŐSÉG**

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

16.2. FORGALMAZHATÓSÁG

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.3. KISZERELÉSI EGYSÉGEK

10 ml.

16.4. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

825/1998 FVM

