



Bolfo[®] bolha- és kullancsirtó nyakörv kutyák és macskák részére A.U.V.



Kutyák és macskák részére

Összetétel és méret

10g nyakörv 0,94 g propoxur-t (2-Isopropoxifenil-N-metilkarbamát-ot) tartalmaz. A nyakörv két méretben 66 cm és 35 cm), valamint négy színben (fekete, fehér, barna és színtelen) készül.

Javallat

A készítmény kutya és macska ektoparazitái által okozott fertőzések megelőzésére és megszüntetésére alkalmas. Kizárólag külsőleg használható. A nyakörv a feltétel után 24 órával fejti ki hatását. A hatékonyság szintjét és időtartamát befolyásolja az állat szőrzetének állapota és hosszúsága, az állat aktivitása, a fertőzöttség mértéke.

Adagolás, alkalmazás

Válasszuk ki az állat testsúlyának megfelelő nyakörvet, majd vegyük ki a védőcsomagolásból és tegyük a feltekert nyakörvet szabaddá. A nagyobb méretű nyakörv 10-40 ttkg közötti kutyáknak, míg a kisebb méretű 10 ttkg alatti kutyáknak és macskáknak ajánlott. Lazán helyezük fel az állat nyakára, és a nyakörv végét dugjuk át a bújatón. Jó felhelyezésnél a nyak bőre és a nyakörv között kétujjnyi hely marad. A Bolfo nyakörv az állatok külső élősködői ellen (bolha, kullancs, tetű) csak folyamatos viselés mellett hatékony. A készítmény hatékonyságának csökkenése úgy ellenőrizhető, hogy egy tárggyal megkaparjuk a nyakörvet. Ha a kaparás helye fehé színű, akkor nyakörv még tartalmaz hatóanyagot. Ellenkező esetben új nyakörvet szükséges felhelyezni. A nagyobb méretű nyakörv bolhák ellen 5, a kisebb 4 hónapig hatékony, míg a kullancsok elleni hatás 10 hétig tart. Az elhanyagolt, csapzott, zsíros szőrű állatokat ajánlatos a nyakörv feltétele előtt megfürösztetni, a nyakörv vízálló, de az állat fürdetése előtt célszerű levenni.

Mellékhatás

A nyakörv felhelyezését követő első napokban az érzékeny állatoknál bőrrézkénység, enyhe viszketés léphet fel.

Ellenjavallat

Nagyfelületű bőrsérülés esetén ne alkalmazzuk. Beteg, vagy lábadozó állatokon ne alkalmazzuk.

Figyelmeztetés

Gyermekeket ne engedjük játszani a nyakörvvel! A nyakörv viselése alatt más insecticid szerrel ne kezeljük az állatot. A nyakörv darabjának véletlen lenyelése esetében pupilla szűkület, hányás, nyálzás, hasmenés léphet fel, ez esetben azonnal forduljon állatorvoshoz. A propoxur ellenszere az atropinszulfát.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Élelmiszer-termelő állatokon nem alkalmazható!

Éltarthatóság és tárolás

Az eredeti, felbontatlan csomagolásban, max. 25 C°-on a gyártástól számított 5 évig éltartható. Lejárati időn túl a készítmény nem használható fel. Gyermekek elől elzárva kell tartani. Élelmiszerektől, italoktól, valamint takarmányoktól elkülönítve tárolandó.

Csomagolás

1 nyakörv többretegű fóliában és papírdobozban.

Munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok

A nyakörv felhelyetését követően bő vízzel alaposan mossunk kezét. A bolha galandféreg köztigazdaja lehet, ezért ajánlatos egyidejűleg megfelelő galandféreg elleni kezelést is alkalmazni pl: Drontal Plus vagy Droncit tablettával. Az állatok környezetét a paraziták és fejlődési alakjaik eltávolítása céljából rendszeresen takarítsuk és fertőtlenítsük.

Egyéb előírások

Szabadon forgalmazható. Állatgyógyászati célra.

Törzskönyvi szám

249/1999 FVM.

Gyártja

BAYER AG, (Németország)

Forgalmazza

BAYER HUNGÁRIA Kft. H-1012 Budapest, Pálya u. 4-6.

