

## ***Használati utasítás*** **Cestacat Flavour A.U.V.**

### **HATÓ-ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

Minden tableta tartalmaz:

Praziquantel	20,0 mg
Pirantel-pamoát	230,0 mg

Segédanyagok: laktóz, búzakeményítő, povidon, talkum, magnézium sztearát, karboximetil-keményítő-nátrium, ízesítő anyagok.

**A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL**

LAVET Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 14.)

### **CÉLÁLLATFAJOK**

Macska

### **JAVALLAT(OK)**

Macskák valamennyi jelentős bélféreg-fertőzöttségének kezelésére:

Orsóférgesség: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina* (fiatal alakok ellen is)

Kampósféreg-fertőzöttség: *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*

Galandférgesség: *Echinococcus multilocularis*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum* (fiatal alakok ellen is)

### **ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

4 testtömeg kilogrammonként 1 tableta

< 2 kg            1/2 tableta

2-4 kg            1 tableta

4-8 kg            2 tableta

### **ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)**

Oralis alkalmazás. Koplaltatás az adagolás előtt nem szükséges.

### **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**

A tablettát közvetlenül a szájba vagy erre alkalmas táplálékba (egy darab húsba, kolbászba, stb.) helyezve adhatjuk be. A szokásos féregtelenítéshez 1 kezelés elegendő, de súlyos fertőzöttség esetén három egymást követő napon át adjuk az előírt dózisban, majd a kezelést 14 nap múlva meg kell ismételni.

Az újr fertőződés veszélye miatt a megelőző kezelést 3 havonta célszerű elvégezni.

Vemhes állatok kezelésére is használható.

### **ELLENJAVALLATOK**

A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely más segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

### **MELLÉKHATÁSOK**

A készítmény akut toxicitása >2000 mg/ttkg. A célállat-tolerancia vizsgálatok során a tanulmányozott klinikai, hematológiai, illetve biokémiai paraméterek egyike sem mutatott szignifikáns elváltozást még ötszörös túladagolás esetén sem.

Mellékhatások a klinikai vizsgálatok során sem mutatkoztak.

Ha nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

### **ÉLELMISZER-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Élelmiszer-termelő állatok a készítménnyel nem kezelhetők.

### **KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

**Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!**

Száraz, fénytől védett helyen 15-25°C között tartandó.

**Lejárató idő:** eredeti csomagolásban a gyártástól számított 2 év.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

### **KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

### *Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók*

A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonista hatás miatt a készítményt ne alkalmazzuk piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen ne használjuk együtt szerves foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai sajátosságok miatt kerülni kell a készítmény morantellel és levamizollal való együttes használatát.

### *Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)*

A készítmény túladagolása gyakorlati körülmények között igen ritkán fordulhat elő, a preparátum széles terápiás sávja miatt. Amennyiben az extrém túladagolás miatt feltételezett toxikus hatásra utaló tünetek jelentkeznek, szükség esetén tüneti kezelést kell végezni.

### *Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok*

Az általános munkavédelmi óvórendszabályokat kell betartani!

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Prazikvantel vagy pirantel-pamoát iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.

Az állatokat a tableta beadása után 24 óráig tartsuk zárt helyen és az ürített bélsarat, férgek, féregizeket, petéket égessük el. Az állat környezetét gyakran takarítsuk és fertőtlenítsük, majd alaposan mossunk kezét. A kezelést követő napokban a gyerekeket tartsuk távol a macskáktól.

### **A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A Cestacat Flavour A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe.

### **A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2006. június 23.

### **TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

### **Rendelhetőség**

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

### **Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

### **Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság**

Elsődleges csomagolóanyag: 2 tableta alumínium/polietilén (strip) fóliában

Másodlagos csomagolóanyag: papírdoboz, tartalma: 5x2 tableta/doboz

### **Törzskönyvi szám**

646/1995. FM