

Használati utasítás **Cestal Plus Flavour A.U.V.**

HATÓ-ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Minden tableta tartalmaz:

Praziquantel	50,0 mg
Pirantel-pamoát	144,0 mg
Fenbendazol	200,0 mg

Segédanyagok: laktóz, búzakeményítő, povidon, talkum, magnézium sztearát, karboximetil-keményítő-nátrium, ízesítő anyagok.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

LAVET Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 14.)

CÉLÁLLATFAJOK

Kutya

JAVALLAT(OK)

Kutyák valamennyi jelentős bélféreg-fertőzöttségének kezelésére:

Galandférgesség: *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*
(fiatal alakok ellen is)

Orsóférgesség: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (fiatal alakok ellen is)

Kampósféreg-fertőzöttség: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*

Ostorférgesség: *Trichuris vulpis*

ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

10 testtömeg kilogrammonként 1 tableta

Kölykök és kistestű kutyák:

< 2 kg 1/4 tableta

2-5 kg 1/2 tableta

5-10 kg 1 tableta

Közepes testű kutyák:

10-20 kg 2 tableta

20-30 kg 3 tableta

Nagytestű kutyák:

30-40 kg 4 tableta

40-50 kg 5 tableta

ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)

Oralis alkalmazás. Koplaltatás az adagolás előtt nem szükséges.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A tablettát közvetlenül a szájba vagy erre alkalmas táplálékba (egy darab húsba, kolbászba, stb.) helyezve adhatjuk be. A szokásos féregtelenítéshez 1 kezelés elegendő, de súlyos fertőzöttség esetén három egymást követő napon át adjuk az előírt dózisban, majd a kezelést 14 nap múlva meg kell ismételni.

Az újrafertőződés veszélye miatt a megelőző kezelést 3 havonta célszerű elvégezni.

Vemhes állatok kezelésére is használható.

ELLENJAVALLATOK

A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely más segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

MELLÉKHATÁSOK

A készítmény akut toxicitása >2000 mg/ttkg. A célállat-tolerancia vizsgálatok során a tanulmányozott klinikai, hematológiai, illetve biokémiai paraméterek egyike sem mutatott szignifikáns elváltozást még ötszörös túladagolás esetén sem.

Mellékhatások a klinikai vizsgálatok során sem mutatkoztak.

Ha nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmiszer-termelő állatok a készítménnyel nem kezelhetők.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Száraz, fénytől védett helyen 15-25°C között tartandó.

Lejárat **idő:** eredeti csomagolásban a gyártástól számított 2 év.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók

A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonista hatás miatt a készítményt ne alkalmazzuk piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen ne használjuk együtt szerves foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai sajátosságok miatt kerülni kell a készítmény morantellel és levamizollal való együttes használatát.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)

A készítmény túladagolása gyakorlati körülmények között igen ritkán fordulhat elő, a preparátum széles terápiás sávja miatt. Amennyiben az extrém túladagolás miatt feltételezett toxikus hatásra utaló tünetek jelentkeznek, szükség esetén tüneti kezelést kell végezni.

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok

Az általános munkavédelmi óvórendszabályokat kell betartani!

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Prazikvantel vagy pirantel-pamoát iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.

Az állatokat a tableta beadása után 24 óráig tartsuk zárt helyen és az ürített bélsarat, férgek, féregízeket, petéket égessük el. Az állat környezetét gyakran takarítsuk és fertőtlenítsük, majd alaposan mossunk kezét. A kezelést követő napokban a gyerekeket tartsuk távol a kutyáktól.

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A Cestal Plus Flavour A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006. június 23.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerelési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

Elsődleges csomagolóanyag: 2 tableta alumínium/polietilén (strip) fóliában

Másodlagos csomagolóanyag: papírdoboz, tartalma: 5x2 tableta/doboz; 100x2 tableta/doboz

Törzskönyvi szám

645/1997. FM