

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**  
Drontal Cat tabletta A.U.V.

2. **HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

1 tabletta tartalmaz:

**Hatóanyagok:**

Pirantel-embonát

230 mg (80 mg pirantel)

Prazikvantel

20 mg.

3. **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL**

**Engedélyes:** Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest Alkotás u. 50.)

**A késztermék felszabadításért felelős gyártó:** KVP, Pharma- und Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Németország)

4. **CÉLÁLLAT FAJOK**

Macska

5. **JAVALLATOK**

Széles hatásspektrumú anthelmintikum macskák gyógykezelésére az alábbi fonálféreg kifejlett alakjai és galandféreg (minden stádium) ellen: *Toxocara mystax (cati)*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeformae*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigena (Taenia) taeniaeformis*, *Mesocestoides spp.*, *Joyeuxiella spp.*

Mivel macskákban a galandféreg fertőzés legkorábban 3 hetes állaton jelentkezhet, a Drontal Cat tabletta használata nem javasolt 3 hetes kor előtt.

6. **ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**





Macskának egyszeri adagja szájon át 5 mg prazikvantel és 20 mg pirantel-embonát / testtömeg kg, ami megfelel 4 testtömeg kg-ra 1 tabletta Drontal Cat-nek. A tabletta szükség szerint osztható.

Egyszeri kezelés elegendő.

7. **ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓDOK**

*Alkalmazás módja:* orális alkalmazás.

8. **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**

	<b>1-2 kg</b>
	<b>2,1-4 kg</b>
	<b>4,1-6 kg</b>
	<b>6,1-8 kg</b>

A tablettákat közvetlenül, vagy ételbe rejtve kell beadni. Koplaltatás vagy a táplálási szokások megváltoztatása nélkül adható.

Megjegyzés: Fonálféreg fertőzés esetén, különösen kölykökben a férgek teljes kiirtása nem várható, így az emberi fertőzés lehetősége megmarad. Ezért kéthetente ismételt kezelés javasolt. Galandféreg ellenes kezelésnél az állatokat a tabletta beadása után 24 óráig tartsuk zárt helyen, és az ürített bélsarat és férgeket égetjük el. Az állat környezetét gyakran takarítsuk és fertőtlenítsük.

9. **ELLENJAVALLATOK**

A kombinációval végzett megfelelő vizsgálatok hiányában vemhes állatokon nem alkalmazható. Használata nem javasolt 3 hetes kor előtt.

10. **MELLÉKHATÁSOK**

Nem ismertek.

Ha nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

11. **ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nem értelmezhető.



**12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

**Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!**  
15-25°C között tárolandó.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. Lejárati idő: 5 év.

**13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK**

Kisebb, mint 5-szörös túladagolás esetén nem jelentkeztek mellékhatások. A mérgezés első várható tünete a hányás.

**14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK.**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2006. március 2.

**16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Van lehetőség arra, hogy nem minden kiserelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához.

**16.1. Rendelhetőség**

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

**16.2. Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**16.3. Kiserelési egységek**

2, 6, 20 tablettát tartalmazó buborékcsoomagolás, papírdobozban.

**16.4. Törzskönyvi szám**

628/1995

