

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Drontal puppy szuszpenzió A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyagok:

Pirantel-pamoát 14,4 mg

Febantel 15,0 mg

Segéd- és vivőanyagok ad 1 ml.

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Engedélyes: Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

A gyártási tétel felszabadításért felelős gyártók:

KVP, Pharma- und Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Németország) és Veterin S.A. 19 300 Aspropyrgos, Attiki, (Görögország)

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

5. JAVALLATOK

Fonálféreg ellenes szer kutyakölyköknek és növendék kutyáknak.

Hatékony az orsóférgesekre (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*), kampósfejű férgek (*Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*), és az ostorférgesekre (*Trichuris vulpis*).

Mivel az orsóférgesség már korán (intrauterin vagy galaktogén fertőződés) jelentkezik, a kezelést Dortal puppy szuszpenzióval 2 hetes kor körül el kell kezdeni. A kezeléseket 2 hetenként ajánlatos megismételni. A kezelést követően a fonálféreg 2-3 napon belül elpusztulnak.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény egyszeri adagja: 15 mg febantel / ttkg és 14,4 mg pirantel-pamoát / ttkg, amely a Dortal puppy szuszpenzióból 1 ml/ ttkg mennyiségnek felel meg.

7. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓDOK

Alkalmazás módja: orális alkalmazás.

Használat előtt jól felrázandó!

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A szuszpenzió eleséghez keverve, vagy a mellékelt pumpás adagolóval közvetlenül is beadható a szájba. Koplattatás vagy a táplálási szokások megváltoztatása nélkül adható.

9. ELLENJAVALLATOK

Nem ismertek.

10. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismertek.

11. ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATNÁL NEM ALKALMAZHATÓ

Élelmiszertermelő állatnál nem alkalmazható.

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

30°C alatt tárolandó.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. Lejárati idő: 3 év.

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A Dortal puppy szuszpenzió 5-szörös túlادagolását növendék kutyák és kölykök tünetmentesen elviseltek. 10-szeres túlادagolás esetén a mérgezés első várható tünete a hányás.

Az állatok a kezelést követő napokban a férgeket ürítik, ezért az ürített bélsarat, férgeket, petéket égezzük el. Az állat környezetét gyakran takarítsuk és fertőtlenítsük, majd alaposan mossunk kezet. A kezelést követő napokban a gyermekeket tartsuk távol a kutyáktól.



14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006. március 2.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Van lehetőség arra, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához.

16.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

16.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.3. Kiszerelési egységek

50 ml, 100 ml szuszpenzió polietilén palackban, polipropilén csavaros zárókupakkal és 5 ml-es adagoló pumpával.

16.4. Törzskönyvi szám

820/1998

