

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE FLUBENOL KH PASZTA A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Flubendazol 44 mg
vivőanyag ad 1 ml

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium / Janssen-Cilag SPA, Latina, Olaszország

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya és macska.

5. JAVALLAT(OK)

Anthelmintikum orsóféreg, horgasfejű féreg és galandféreg fertőzöttség esetén:

Orsóférgék: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*

Kampósfejű férgek: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma canium*, *Ancylostoma tubaeforme*

Ostorféreg: *Trichuris vulpis*

Galandférgék: *Taenia pisiformis*, *Hydatigena taeniaeformis*

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény biztonságosan és könnyen adagolható.

1./ Kutya és macskák orsóféreg és horgasfejű féreg fertőzöttsége esetén 1 ml/2 ttkg (amely egyenértékű 44 mg flubendazol/2 ttkg) adagban egyszer naponta, két egymást követő napon.

2./ Kutya és macskák vegyes fertőzöttsége esetén 1 ml/2 ttkg (amely egyenértékű 44 mg flubendazol/2 ttkg) adagban naponta egyszer, három egymást követő napon.

7. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)

A gyógyszert közvetlenül a kutya, vagy macska szájába kell adagolni, vagy keverjük a szükséges gyógyszer mennyiséget az állat takarmányába, ha az állat nehezen kezelhető, vagy agresszív. Forgassuk a dugattyún lévő gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányban az állat testtömegének megfelelő osztásig, majd távolítsuk el a biztonsági kupakot és végezzük el a kezelést. A következő kezeléskor adjuk hozzá az állat testtömegét a gyűrűnél leolvasható értékhez és állítsuk a gyűrűt a számított új értékre, távolítsuk el a biztonsági kupakot és végezzük el a kezelést.

Példa egy 3 kg-os macska esetében: az első kezeléshez a gyűrűt a 3-as számhoz kell állítani, második kezeléskor a gyűrűt a 6-os számhoz, harmadik kezeléskor a 9-es számhoz.

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Kutya:

Kölyök: 1-2 hetes korban

Fiatalkutya: választáskor, majd 2-3 havonta

Növendék: vakcinázás előtt

Szuka: az ösztroz ideje alatt, ill. 10 nappal az ellés előtt és 10 nappal az ellés után

Felnőtt: évente 3-4 alkalommal.

Általában. vakcinázások előtt

Macska:

Kölyök: 6 hetes korban

Fiatalmacska: 2-3 hónaponként

Felnőtt macska: évente 3-4 alkalommal.

Általában. vakcinázások előtt

9. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretes.

10. MELLÉKHATÁSOK

A flubendazol az állatok általában jól tolerálják. Macskákban a kezelést követően ritkán nyálzás figyelhető meg, amely a kezeléssel járó stresszre vezethető vissza és a készítmény hatékonyságát nem befolyásolja. Kutyaiban ritkán hányás figyelhető meg.

11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem szükséges.

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A készítmény eredeti csomagolásban, 25 C° alatti hőmérsékleten tárolandó.
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Nincsenek.

14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA

2006. január

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

16.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

16.2. Forgalmazhatóság

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.3. Kiszerezési egységek

7,8 ml és 22,5 ml töltőtér fogatú egyszer használatos fecskendők.

16.4. Törzskönyvi szám

424/1991. FVM.