

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁS EGYBEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Frontline® permet A.U.V., 100 ml, 250 ml, 500 ml

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Frontline® permet A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Fipronilum 2,5 mg• Copovidonum, Alcohol isopropylicus, Aqua purificata ad 1 ml

3. GYÓGYSZERFORMA

Külsőleges oldatos permet.

4. KISZERELÉSI EGYSÉGEK

100 ml

250 ml

500 ml

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya, macska

6. JAVALLAT(OK)

Bolhák (*Ctenocephalides spp.*) és kullancsok (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) okozta fertőzés gyógykezelésére és megelőzésére. A készítmény alkalmas továbbá *Trichodectes canis*, *Heterodoxus spiniger* (Európában nem honos), *Linognathus setosus* (tetvek), *Cheyletiella spp.* (ragadozó atkák) elleni védekezésre és bolha okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) kezelésére és megelőzésére. Segítséget nyújt az (*Otodectes cynotis* és a *Sarcoptes scabiei varietas canis*) rühatkák által okozott fertőzöttség leküzdésében.

7. ELLENJAVALLAT(OK)

Nem alkalmazható 2 naposnál fiatalabb kutya- és macskakölykökön.
Nem alkalmazható beteg (szisztémás betegségben szenvedő, lázas) ill. lábadozó állatoknál.
Nyulakon tilos alkalmazni, mert súlyos mellékhatásokat és halált is okozhat.

8. MELLÉKHATÁSOK

Ha lenyalja az állat, akkor rövid ideig tartó nyálzást figyelhetünk meg, amit leginkább a vivőanyag okoz.
Kivételesen nyálzás, átmeneti idegrendszeri tünetek (hyperaesthesia, depresszió), szem irritációjából adódó tünetek, viszketés, szőrhullás, hányás és légzőszervi tünetek fordulhatnak elő.

9. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Adagolás: Az ajánlott dózis 3-6 ml Frontline® permet A.U.V./ttkg (7,5-15 mg fipronil/ttkg), ami 6-12 pumpálást jelent a 100 ml-es illetve 2-4 pumpálást a 250 és 500 ml-es flakonból testtömeg kilogrammonként.

A készítmény kullancs ellen 5 hétig, bolha ellen 1-3 hónapig, tetvek ellen 63 (kutya) illetve 42 (macska) napig véd.

Sarcoptes scabiei var. canis okozta rühösség gyógykezelésére többszöri ismételt kezelés szükséges.

Két kezelés között legalább négy hétnek kell eltelnie, mivel a készítmény ártalmatlansága nem igazolt ennél rövidebb időközönként való alkalmazás esetén.

Alkalmazás módja:

Permetezzük a készítményt az egész testfelületre kb. 10-20 cm-es távolságról az állat szőrére a szőr növekedésével ellentétes irányban, hogy a szőr teljesen átnedvesedjen egészen a bőrig. A hosszúszőrű állat szőrét borzoljuk fel, hogy a készítmény eljusson a bőrre az állat hátán, oldalán, hasán, lábain, vállán és nyakán is. A fej és a szem környékének kezelésekor permetezzük a készítményt a gumikesztyűs kezünkbe és dörzsöljük be finoman a szőrbe. Hagyjuk megszáradni az állatot letörlés nélkül.

El kell kerülni, hogy a készítmény az állat szemébe vagy szájába jusson.

Fontos a pontos adagolás betartása.

10. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS (EK), HA SZÜKSÉGESEK

Gondoskodni kell róla, hogy az állatok egymást vagy magukat ne tudják nyalogatni a kezelés után.

Ne fürdessük/úszassuk az állatot a kezelés előtt és után két napon belül.

Egy-egy kullancs megtapadhat az állaton, ezért a fertőző betegségek átvitelét nem lehet teljesen kizárni.

11. VEMHESÉG ÉS LAKTÁCIÓ IDEJÉN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS

Alkalmazható vemhesség és laktáció idején.

12. AZ ÁLLATOK KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI ÓVŐRENDSZABÁLYOK

A készítmény alkalmazása során gumikesztyű viselése javasolt.

A készítmény nyálkahártya és szem irritációt okozhat, ezért el kell kerülni, hogy szembe vagy szájba jusson.

Az alkalmazó ill. az állat ektoparazitikumokkal vagy alkohollal szembeni ismert túlérzékenysége esetén kerülni kell az érintkezést a készítménnyel.

El kell kerülni, hogy a készítmény a bőrre jusson. Ha ez mégis megtörténik, szappannal és vízzel alaposan kezdet kell mosni.

Ha véletlenül szembe kerül a készítmény, akkor tiszta vízzel alaposan ki kell mosni.

A készítmény használata után kezdet kell mosni.

Amíg az alkalmazás helye szárazzá nem válik, addig a kezelt állatokat nem szabad simogatni és a gyerekeket nem szabad engedni játszani velük. Ezért javasolt az állatokat koráeste kezelni, és ezek az állatok nem aludhatnak a gazdával, különösen gyerekekkel.

A kezelés alatt nem szabad dohányozni, enni és inni.

13. LEJÁRATI IDŐ

Lejáratidő: lásd a flakonra nyomtatva.

14. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Eredeti csomagolásban, napsugárzástól és közvetlen hőhatástól védett helyen, 25°C alatt tárolandó. Fagyástól óvni kell.

15. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZER-KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK MEGSEMISÍTÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A fipronil kedvezőtlenül hat a vízi élőlényekre. El kell kerülni, hogy a készítmény vagy a kiürült csomagolóanyag élővizekbe jusson. A kezelést követő két napon belül a kutyákat tilos természetes vizekben úsztatni.

16. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” megjelölés

Ad usum veterinarium

17. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” megjelölés

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

18. A FORGALOMBA-HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Engedélyes:

MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, France

Gyártó:

MERIAL Toulouse, France

19. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)/TÖRZSKÖNYVI SZÁM

681/1997. FVM

20. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gyártási szám: lásd a flakonra nyomtatva.

21. RENDELHETŐSÉG/KIADHATÓSÁG

Állatorvosi vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítmény. Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.