

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

<b>Az állatgyógyászati készítmény neve:</b>	<b>FRONTLINE COMBO<sup>R</sup> SPOT-ON MACSKA A.U.V.</b>
<b>Összetétel:</b>	Fipronil 50,00 mg, (S) metoprén 60,00 mg, segéd- és vivőanyag ad 0,50 ml egy pipettában
<b>Gyógyszerforma:</b>	Rácsepegtető oldat
<b>Gyártó/törzskönyvi engedélyes:</b>	MERIAL S.A.S. (Lyon, Franciaország)
<b>Célállat:</b>	Macska
<b>Javallat:</b>	<p>Macskák kezelésére:</p> <p>Elsősorban bolhák ellen alkalmazható, valamint kullancsok és/vagy szőrtetvek ellen. Bolhák ellen (<i>Ctenocephalides spp.</i>). A kifejlett bolhák által okozott újrafertőződés elleni inszekticid hatás 4 hétig tart. A bolhák szaporodásának megakadályozása a kifejlett bolhák által lerakott peték (ovicid hatás), az abból származó lárvák és bábok (larvicid hatás) fejlődésének gátlása az alkalmazást követő 6 hétig tart.</p> <p>Kullancsok ellen (<i>Ixodes ricinus</i>, <i>Dermacentor variabilis</i>, <i>Rhipicephalus sanguineus</i>).</p> <p>A termék 2 héten keresztül folyamatosan tartó atkaölő hatással rendelkezik kullancsok ellen.</p> <p>Szőrtetvek ellen (<i>Felicola subrostratus</i>).</p> <p>A termék felhasználható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (Flea Allergy Dermatitis, FAD) kezelési stratégiájának részeként.</p>
<b>Adagolás:</b>	<p>Egy macskának egy 0,50 ml-es pipetta tartalmának bőrre történő helyi alkalmazása a minimálisan ajánlott fipronil adagnak, 5,0 mg/kg-nak, és a minimálisan ajánlott (S)-metoprén adagnak, 6,0 mg/kg-nak, felel meg.</p> <p>Két kezelés között legalább négy hétnek kell eltelnie ártalmatlansági kísérleti eredmények hiányában. Vemhesség és szoptatás alatt a termék alkalmazható.</p>
<b>Alkalmazás módja:</b>	<p>Külsőleg, az állat bőrfelületére helyi, ún. spot on alkalmazással.</p> <p>Tartsuk függőlegesen, keskeny végével felfelé a pipettát. A pipetta keskeny részét ütögetjük meg úgy, hogy a tartalma a pipetta főtestében maradjon. Pattintsuk hátra a pipetta elkeskenyedő végét. Az állat hátán, a nyak kezdeténél, a váll vonala előtt hajtsuk szét a szőrtetvet oly módon, hogy a bőr láthatóvá váljon. Helyezzük a pipetta elkeskenyedő végét a bőrre és nyomjuk ki többször úgy, hogy a tartalma teljesen kiürüljön, közvetlenül egy helyre, a bőrre.</p>
<b>Ellenjavallat:</b>	<p>Adatok hiányában 8 hetesnél fiatalabb és/vagy 1 kg-nál könnyebb macskakölyköknél nem alkalmazható. Nem alkalmazható beteg (szisztémás betegség, láz) ill. lábadozó állatokon. Nyulakon nem szabad alkalmazni, mert nemkívánatos reakciók, elhullás is előfordulhat.</p>
<b>Mellékhatások:</b>	<p>Ha lenyalás fordul elő, akkor rövid ideig túlzott mértékű nyálzás figyelhető meg, ami leginkább a vivőanyag természete miatt jön létre.</p> <p>A rendkívül ritkán előforduló mellékhatások közül rövid ideig tartó bőr reakciókat (a bőr elszíneződése, helyileg a szőr kihullása, viszketegség, kipirosodás) és testszerte viszketegséget vagy a szőr kihullását figyelték meg az applikáció helyén a termék használata után. Kivételesen túlzott nyálérválasztás, átmeneti idegrendszeri tünetek (túlérzékenység, depresszió, ingerlékenység), hányás, vagy légzési tünetek fordultak elő a készítmény alkalmazása után.</p> <p>A túladagolás kerülendő.</p>
<b>Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:</b>	Élelmiszertermelő állatnak nem adható.
<b>Tárolás:</b>	+ 30 °C alatti hőmérsékleten tárolandó. Az eredeti csomagolásban tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó. Tűzveszélyes.
<b>Figyelmeztetés:</b>	<p>Fontos megbizonyosodnunk arról, hogy a terméket olyan helyre juttattuk, ahonnan az állat nem tudja lenyalni és az állatok egymást sem tudják nyalogatni a kezelés után. Nincs adat macskáknál a fürdetés /samponozás hatékonyságot csökkentő hatásáról. A kutyákra vonatkozó hasonló adatok alapján a termék alkalmazása utáni két napon belül nem ajánlott fürdetni az állatokat. Egy-egy kullancs megtapadhat az állaton. Emiatt, kedvezőtlen körülmények között, a fertőző betegségek átvitelét</p>

kullancsok által nem lehet teljesen kizárni. Az állatokról származó bolhák gyakran elszaporodnak az állatok kosarában, fekvő- és pihenőhelyén, a padlón és a kárpitokon. Tömeges elszaporodáskor és az ellenintézkedések megkezdésekor ezeket a helyeket kezelni kell megfelelő rovarirtó szerrel, és rendszeresen porszívózni kell.

Kerülni kell a terméknek az állat szemébe jutását.

**Munkavédelmi óvórendszabályok:**

A termék nyálkahártya- és szem irritációt okozhat. Ezért el kell kerülni a terméknek a szembe ill. szembe jutását. A kezelést végző személy ill. az állat inszekticidekkel vagy alkohollal szembeni, ismert túlérzékenysége esetén kerülni kell az érintkezést a termékkel. Kerülni kell a pipetták tartalmának az ujjakkal történő érintkezését. Ha előfordul, szappannal és vízzel kezdet kell mosni. Ha véletlenül szembe kerül a termék, akkor bő vízzel alaposan ki kell mosni. Használat után kezdet kell mosni.

Amíg a kezelés helye meg nem szárad, addig a kezelt állatokat nem szabad megfogni, és a gyermekeket nem szabad engedni, hogy játszanak velük. Emiatt nem napközben, hanem koraeste javasolt kezelni az állatokat. A kezelt állatok ne aludjanak együtt a gazdákkal, különösen a gyermekekkel.

A kezelés alatt nem szabad dohányozni, enni és inni.

**Eltarthatóság:**

3 év. A csomagoláson jelzett időpontig.

**Rendelhetőség:**

Állatorvosi vény nélkül forgalmazható! Állatgyógyászati célra!

**Forgalmazhatóság:**

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**Kiszerezés:**

1 X 0,50 ml pipetta letörhető fejjel bliszter csomagolásban.

Egy kartondobozban egy bliszter csomagolás, a bliszter csomagolásban 3 x 0,50 ml pipetta letörhető fejjel.

Egy kartondobozban két bliszter csomagolás, a bliszter csomagolásban 3 x 0,50 ml pipetta letörhető fejjel.

**Törzskönyvi szám:**

1403/2004. FVM

**Környezetvédelmi előírások:**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A készítmény nem kerülhet a természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

**Használati utasítás jóváhagyásának időpontja:** 2004. április 30.