

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Interzol 6,75% pulvis A.U.V.

HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 gramm por tartalma:

Hatóanyag:

Oxfendazol 67,5 mg

Segéd- és vivőanyagok:

Butil-hidroxitoluol (mikronizált), Sipernat 22S, laktóz

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Alvetra u. Werfft A.G.Boltzmanngasse 11, A-1090 Wien, Ausztria

CÉLÁLLAT FAJ:

Sertés

JAVALLAT:

Sertések fonalférgességének (kifejlett és fejlődési alakok) kezelésére.

Hatékony az *Ascaris suum*, a *Hyostrongylus rubidus*, az *Oesophagostomum spp.* *Trichuris suis*, *Metastrongylus spp.* fajokkal szemben. Ovocid hatással is rendelkezik.

ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény általános adagja:

4,5 mg oxfendazol/ttkg (megfelel 67 mg Interzol 6,75 % pulvis A.U.V.-nek), azaz 1,0 g készítmény/15 ttkg, egyszeri alkalommal.

ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD

Szájon át, kizárólag takarmányba keverve alkalmazandó.

ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely segéd vagy vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Alkalmazása vemhesség és laktáció idején nem javallott, kizárólag a kezelést végző állatorvos javaslatára, a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható.

MELLÉKHATÁSOK:

Nem ismeretesek.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés (ehető szövetek): 14 nap.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Száraz helyen, +25°C alatt, fénytől védve tárolandó.

Felhasználható a gyártástól számított 2 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Beteg vagy legyengült állatok kezelését fokozott elővigyázatossággal végezzük!

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók:

Nem ismeretes.

Túladagolás :

Az oxfendazol széles terápiás sávval rendelkező vegyület, ötszörös túladagolás esetén sem vált ki nemkívánatos hatást.

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok:

Kerülni kell a készítmény bőrre vagy nyálkahártyára való jutását. A bekeverésnél védőszemüveg, védőkesztyű és szájkendő vagy porvédő maszk használata kötelező.

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2003. június 16.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez.

Rendelhetőség:

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

Kizárólag engedéllyel rendelkező takarmánykeverő üzemek keverhetik be.

Kiszerezési egységek:

45gramm

Törzskönyvi szám:

1073/1999. FVM

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Interzol 6,75% pulvis A.U.V.

HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 gramm por tartalma:

Hatóanyag: Oxfendazol 67,5 mg

Segéd- és vivőanyagok: Butil-hidroxitoluol (mikronizált), Sipernat 22S, laktóz

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Alvetra u. Werfft A.G.Boltzmanngasse 11, A-1090 Wien, Ausztria

CÉLÁLLAT FAJ: Sertés

JAVALLAT: Sertések fonalférgességének (kifejlett és fejlődési alakok) kezelésére.

Hatékony az *Ascaris suum*, a *Hyostrongylus rubidus*, az *Oesophagostomum spp.*

Trichuris suis, *Metastrongylus spp.* fajokkal szemben. Ovocid hatással is rendelkezik.

ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény általános adagja:

4,5 mg oxfendazol/ttkg (megfelel 67 mg Interzol 6,75 % pulvis A.U.V.-nek), azaz 1,0 g készítmény/15 ttkg, egyszeri alkalommal.

ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD

Szájon át, kizárólag takarmányba keverve alkalmazandó.

ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely segéd vagy vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Alkalmazása vemhesség és laktáció idején nem javallott, kizárólag a kezelést végző állatorvos javaslatára, a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható.

MELLÉKHATÁSOK: Nem ismeretesek.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés (ehető szövetek): 14 nap.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Száraz helyen, +25°C alatt, fénytől védve tárolandó.

Felhasználható a gyártástól számított 2 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Beteg vagy legyengült állatok kezelését fokozott elővigyázatossággal végezzük!

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók: Nem ismeretes.

Túladagolás : Az oxfendazol széles terápiás sávval rendelkező vegyület, ötszörös túladagolás esetén sem vált ki nemkívánatos hatást

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi

óvórendszabályok: Kerülni kell a készítmény bőrre vagy nyálkahártyára való jutását. A bekeverésnél védőszemüveg, védőkesztyű és szájkendő vagy porvédő maszk használata kötelező.

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2003. június 16.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez.

Rendelhetőség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

Kizárólag engedéllyel rendelkező takarmánykeverő üzemek keverhetik be.

Kiszerezési egységek : 1kg

Törzskönyvi szám: 1073/1999. FVM