

Panacur paszta A.U.V.

Összetétel

1 adagoló fecskendő 3,75 g fenbendazolt tartalmaz.

Célállat

Ló, szamár.

Javallat

Kis és nagy strongylidákkal, ascaridákkal oxyurisokkal és strongyloidesekkel fertőzött lovak és szamarak kezelésére.

Alkalmazás módja

Szájon át, ügyelve arra, hogy a szájban ne legyen takarmány.

Adagolás

Általános adagja 7,5 mg fenbendazol/ttkg. Egy adagoló tartalma egy 500 ttkg-os állat kezelésére elegendő.

Két-három hetes Strongyloides westeri okozta hasmenésének gyógyítására 50 mg fenbendazol/ttkg dózist kell adni. Ebben az esetben egy adagoló tartalma egy 75 ttkg-os csikó kezelésére elegendő.

Alkalmazás

A féregtelenítésre egyszeri kezelés elegendő. Újabb fertőződés esetén a kezelést meg kell ismételni. Diétás intézkedésekre sem a kezelés előtt, sem a kezelés után nincs szükség..

Ellenjavallat

Nem ismeretes.

Mellékhatás

Nem ismeretes.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Ehető szövetek 20 nap.

Csomagolás

10x24 g-os adagoló.

Eltarthatóság

A gyártástól számított 5 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.

Tárolás

Szobahőmérsékleten

Gyermek elől elzárva tartandó.

Rendelhetőség

Állatorvosi rendelvényre. Állargyógyászati felhasználásra.

Törzskönyvi szám

492/1992

Gyártja

Intervet International, Boxmeer, Hollandia.