

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Preventic kullancsirtó nyakörv kutyák részére A. U. V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Virbac S.A. (1^{ère} Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Franciaország).
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Virbac S.A. (1^{ère} Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Franciaország).

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Preventic kullancsirtó nyakörv kutyák részére A. U. V

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

100 g nyakörv tartalmaz: gramm

amitráz 9,0

Egy nyakörv 2, 475 g amitrázt tartalmaz.

Segédanyag:

Di (2-etil hexil) adipát

4. JAVALLAT(OK)

Kutyák kullancs (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) fertőzöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén 4 hónapos védelmet nyújt.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható beteg, lábadozó, legyengült állatokon, valamint bőrsérülések esetén. Nem használható 8 hetes kornál fiatalabb kutyakölykökön. Vemhes, vagy szoptató szukákon nem használható. Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segéd- és vivőanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. Macskákon nem használható.

6. MELLÉKHATÁSOK

Egyedi allergiás reakció vagy bőrelváltozás jelentkezése esetén a nyakörvet azonnal el kell távolítani.

Az amitráz mellékhatásait hypothermia, bradycardia, hyperventilatio rendeltetészerű felhasználás esetén nem jelentkeznek.

7. CÉLÁLLAT FAJ

Kutya

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Külső használatra. A Preventic nyakörv felbontás után 4 hónapig hatásos a kullancsok ellen. A nyakörvet csak 8 hetesnél idősebb kutyákra tegyük. Csak közvetlenül a felhasználás előtt bontsuk ki a nyakörvet a légmentes csomagolásból. Lazán helyezzük az állat nyaka köré és a csattal úgy állítsuk, hogy a nyakörv és az állat nyaka közötti résbe mutatóujjunk kényelmesen beférjen. A felesleges részt vágjuk le. A nyakörvet folyamatosan a kutya nyakán kell hagyni ahhoz, hogy hatását kifejtsé. Négy hónapos használat után a nyakörvet le kell venni az állat nyakáról és csak egy hónap pihentetés után szabad újabb amitráz hatóanyagú nyakörvet felhelyezni. A nyakörv felhelyezésekor a kutyán lévő kullancsok még két napig is életben maradhatnak a kutya bőrébe fúródva. Ezért javasolt a kullancsok eltávolítása a nyakörv felhelyezése előtt a további vérszívás megakadályozása céljából. Nem zárható ki egy-egy kullancs megtapadása a kutyán, ezért az általuk közvetített fertőző betegségek átadását kedvezőtlen körülmények között nem lehet teljes mértékben kizárni.

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az állat gyakori fürdetése, samponozása vagy úsztatása elkerülendő, mivel a hatékonyság csökkenéséhez vezet, ha előtte a nyakörvet nem veszik le az állatról. A nyakörv menta illatú, nem zavarja a kutyák szaglását.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz helyen, legfeljebb 25 °C hőmérsékleten tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó! Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól elkülönítve tartandó.

Lejáratási idő:

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejáratási ideje 18 hónap.

A felbontás után 4 hónapig hatékony.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz**

Nem szabad engedni, hogy a kutyák a nyakörvet nyaldossák, megrágnak vagy játsszanak vele.

Külső használatra! Ellenőrizni szükséges a nyakörv szorosságát a bőrkiütések elkerülésére. A nyakörv használata elővigyázatosságot követel: a nyakörvet viselő állattal való játék vagy foglalkozás során kerülni kell a nyakörv érintését.

Túladagolás:

Specifikus ellenszer: yohimbin, adagja 0,1 mg/kg.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A nyakörv felhelyezése közben enni, inni, dohányozni tilos! Érintése után szappanos vízzel alaposan kezni kell mosni. A nyakörvet viselő kutyától a gyermekeket távol kell tartani.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók

Más ektoparazita ellenes készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A készítmény maradékát és kiürült csomagolóanyagát nem szabad élővízbe juttatni, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2008. június 5.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kutyák részére 27,5 gramm tömegű és 65 cm hosszú nyakörv többrétegű fólia tasakban és karton dobozban.