

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Profender rácsepegtető oldat kistestű macskáknak.  
Profender rácsepegtető oldat közepes testű macskáknak.  
Profender rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak.

### 2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

#### Hatóanyagok:

A Profender 21,4 mg/ml emodepszidet és 85,8 mg/ml t prazikvantel tartalmaz.

1 adag (cseppentő pipetta) Profender tartalmaz:

	Térfogat	Emodepszid	Prazikvantel
Profender rácsepegtető oldat kistestű macskáknak ( $\geq 0,5 - 2,5$ kg)	0,35 ml	7,5 mg	30 mg
Profender rácsepegtető oldat közepes testű macskáknak ( $> 2,5 - 5$ kg)	0,70 ml	15 mg	60 mg
Profender rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak ( $> 5 - 8$ kg)	1,12 ml	24 mg	96 mg

#### Vivóanyagok:

5,4 mg/ml Butil-hidroxianizol (E320; mint antioxidáns)

### 3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

#### Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer HealthCare AG  
D-51368 Leverkusen  
Németország / Germany

#### Gyártási tétel felszabadításért felelős gyártó:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
D-24106 Kiel  
Németország / Germany

### 4. CÉLÁLLAT FAJOK

Macska

### 5. JAVALLATOK

Az alábbi fonál és galandférgek által okozott kevert parazitás fertőzéstől szenvedő, vagy ezek kockázatának kitett macskák részére:

#### Fonálférgek (Nematoda)

*Toxocara cati* (kifejlett féreg, nem kifejlett féreg, L4 és L3)

*Toxascaris leonina* (kifejlett féreg, nem kifejlett féreg és L4)

*Ancylostoma tubaeforme* (kifejlett féreg, nem kifejlett féreg és L4)

#### Galandférgek (Cestoda)

*Dipylidium caninum* (kifejlett féreg)

*Taenia taeniaeformis* (kifejlett féreg)

*Echinococcus multilocularis* (kifejlett féreg)

## 6. ADAGOLÁS

### Adagolás és az alkalmazás módja

Az ajánlott legkisebb adag 3 mg emodepszid / testtömeg kg és 12 mg prazikvantel / testtömeg kg, ami megfelel 0,14 ml Profender-nek testtömeg kg-onként.

Macska testtömege (kg)	A használandó cseppentő pipetta mérete	Térfogat (ml)	Emodepszid (mg/ttkg)	Prazikvantel (mg/ttkg)
≥0,5 – 2,5	Profender rácsepegtető oldat kistestű macskáknak	0,35	3 - 15	12 - 60
>2,5 - 5	Profender rácsepegtető oldat közepes testű macskáknak	0,70	3 - 6	12 - 24
>5 - 8	Profender rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak	1,12	3 – 4,8	12 – 19,2
>8	A cseppentő pipetták megfelelő kombinációja			


Kezelésenként egyetlen alkalmazás hatékony.

## 7. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD

Kizárólag külsőleges alkalmazásra.


## 8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Vegyen ki egy cseppentő pipettát a csomagolásból. Tartsa a cseppentő pipettát álló helyzetben, és csavarva húzza le a biztonsági kupakot. Használja a kupak másik végét a zárófólia áttörésére.



Ezután a tarkón, a koponya alapjánál hajtsa szét a szőrzetett úgy, hogy a bőr láthatóvá váljék. Érintse a pipetta hegyét a bőrhöz és a pipetta hasának többszöri összenyomásával ürítse a tubus teljes tartalmát a

bőrre. A tarkótájékon alkalmazva minimálisra csökkenti a macska képességét, hogy lenyalja a terméket. Csak az ép bőr felületére alkalmazza.



## 9. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható 8 hetesnél fiatalabb vagy 0,5 kg-nál könnyebb macskakölykökön.

## 10. MELLÉKHATÁSOK

Nyálzás és hányás alkalmanként előfordulhat, ha a macska véletlenül megnyalja a kezelés helyét közvetlenül a kezelés után.

Ha egyéb nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

## 11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

## 12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
Az eredeti csomagolásban tárolandó, hogy nedvességtől védjük.  
Felhasználható a címkén és a külső csomagoláson feltüntetett időpontig.

## 13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Szájon át vagy parenterálisan nem alkalmazható.

Ne engedjük, hogy a kezelt macska közvetlenül a kezelés után, vagy a háztartásban tartott másik macska a kezelés helyét nyalogassa amíg az nedves.

Beteg és legyengült állatokra vonatkozóan csak korlátozott ismeretek állnak rendelkezésre, ezért a termék ezeken az állatokon csak terápiás kockázat/ előny elemzés alapján használható.

A kezelés után végzett samponos fürdetés vagy átvizesedés csökkentheti a termék hatékonyságát. A kezelt állatot ezért a rácseppentett oldat száradásáig nem szabad fürdetni.

A felhasználónak:

A termék használata közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos.

Kerülje a közvetlen érintkezést a kezelt területtel, amíg az nedves. A kezelt terület száradásáig a kezelt állatot gyermekektől távol kell tartani.

Használat után alaposan kezet kell mosni.

A bőrre került szennyeződést szappannal és vízzel azonnal le kell mosni.

Ha véletlenül a készítmény a szembe kerül, bő vízzel teljesen ki kell öblíteni.

Ha a bőr vagy szem érzékenysége huzamosabb ideig fennáll, vagy a készítményt véletlenül lenyelték, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és a használati utasítást vagy a címkét megmutatni.

Ügyelni kell rá, hogy a termékkel való kezelést követő 24 órában a kezelt macska ne kerüljön hosszas intenzív érintkezésbe gyermekkel (pl. együtt alvás).

Bár a terméket vemhes macskák jól tolerálták, patkányokon és nyulakon végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az emodepszid lehet hogy befolyásolja az embrio/magzat fejlődését.

Ezért szülőképes korban lévő nők ne használják a terméket, vagy viseljenek eldobható gumikesztyűt a termék alkalmazásakor.

A terméket rendszeresen alkalmazók (pl.: állatorvosok, hivatásos macskatenyésztők) viseljenek eldobható gumikesztyűt a termék alkalmazásakor.

A termék oldószere megfesthet egyes anyagokat így bőrt, szövetet, műanyagokat és zárt felületeket. Hagyjuk a kezelés helyét megszáradni, mielőtt ilyen anyagokkal érintkezést engedünk.

#### **14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

A Profender nem kerülhet felszíni vizekbe, mert az emodepszid káros/ártalmas hatást mutatott a vízi élőlényekre.

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

#### **15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

#### **16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Vemhesség és laktáció ideje alatt alkalmazható.

Bármely anthelmintikum családdal szemben kialakulhat rezisztencia az adott családba tartozó anthelmintikum ismételt gyakori alkalmazása után.

Az echinococcosis az emberekre is veszélyes. Az echinococcosis az OIE felé jelentendő betegség, a kezelésre és az azt követő megfigyelésre, valamint az érintettek védelmére megfelelő irányelveket kell beszerezni az illetékes hatóságtól.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszereelési egység kerül kereskedelmi forgalomba.

Ezzel az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos bármely további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.